

## ТЕСТ ПО ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ВАРИАНТ 2

ФИО

Номер группы

(1)КАКИЕ ЖЕЛЕЗЫ СФОРМИРОВАННЫ И ФУНКЦИОНИРУЮТ К РОЖДЕНИЮ

1. потовые железы
2. сальные железы
3. потовые и сальные железы

(2)ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЁННОСТИ

1. с рождения до окончания 10-х суток
2. с рождения до 28 дня
3. с рождения до окончания первых суток
4. с рождения до 15 дня

(3)ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1. с рождения до конца 1 года жизни
2. с 29 дня до конца 1 года жизни
3. с 7 дня до конца 1 года жизни
4. с 21 дня до конца 1 года жизни

(4)ВСКАРМЛИВАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ, КОГДА ОНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1. непосредственным прикладыванием ребёнка к груди его биологической матери
2. кормилицей
3. термически обработанным донорским молоком

(5)ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УБЫЛЬ МАССЫ ТЕЛА

1. отмечается у всех детей
2. отмечается у части детей
3. не должна быть ни у кого

(6) ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ

1. в Москве в 1844 г
2. в Санкт-Петербурге в 1834 г
3. в Санкт-Петербурге в 1806 г

(7) ДАТА РОЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ КАФЕДРЫ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

1. в 1865 г в Медико-Хирургической академии в Санкт-Петербурге
2. в 1765 г в Московском университете
3. в 1798 г в Медико-Хирургической академии в Санкт-Петербурге

(8) СООТНОШЕНИЕ Б:Ж:У В ЖЕНСКОМ ГРУДНОМ МОЛОКЕ

1. 1:1,2:1,4
2. 1:3:6
3. 1:4:8

(9) \*ЗРЕЛОЕ\* ГРУДНОЕ МОЛОКО НАЧИНАЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ

1. к началу 3 недели после родов
2. с рождения
3. к концу 2 месяца после родов

(10) В МОЛОЗИВЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО \*ЗРЕЛЫМ\* ГРУДНЫМ МОЛОКОМ

1. меньше белка, больше жира и лактозы
2. больше белка, меньше жира и лактозы
3. меньше белка, жира и лактозы
4. больше белка, жира и лактозы

(11)ПРИ 7-МИ РАЗОВОМ КОРМЛЕНИИ ИНТЕРВАЛ СОСТАВЛЯЕТ

1. 3 часа
2. 4 часа
3. 2 часа
4. 4,5 часа

(12)ПРИ 5-ТИ РАЗОВОМ КОРМЛЕНИИ ИНТЕРВАЛ СОСТАВЛЯЕТ

1. 3 часа
2. 4 часа
3. 2,5 часа
4. 4,5 часа

(13)ВИТАМИН Д-ДЕФИЦИТНЫЙ РАХИТ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ

1. в возрасте 10-12 лет
2. на первом году жизни
3. в возрасте 3-6 лет
4. в возрасте 7-9 лет

(14)НЕ НУЖДАЮТСЯ В ДОТАЦИИ ВИТАМИНА Д ДЕТИ

1. находящиеся на естественном вскармливании
2. неболеющие инфекционными заболеваниями
3. на искусственном вскармливании адаптированными смесями

(15)В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ПРИКОРМА В РАЦИОН ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА ВВОДЯТ

1. овощное пюре или кашу
2. фруктовый сок
3. кефир
4. мясной бульон

(16) В КАЧЕСТВЕ ТРЕТЬЕГО ПРИКОРМА В РАЦИОН ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА ВВОДЯТ

1. овощное пюре или кашу
2. яичный желток
3. мясной фарш
4. бульон

(17) КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ЗДОРОВЬЯ

1. 3
2. 2
3. 6
4. 4

(18) ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЁТА ДЛИНЫ ТЕЛА ДЕТЕЙ ДО 1 Г

\*

(19) ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЁТА ДЛИНЫ ТЕЛА СТАРШЕ 6 ЛЕТ

\*

(20) ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЁТА МАССЫ ТЕЛА ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ

\*